

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Первая категория.

1. При удалении моляров нижней челюсти применяется анестезия:

Номер правильного ответа: 4

- 1) инфильтрационная
- 2) туберальная
- 3) ментальная
- 4) по Гоу-Гейтсу
- 5) палатинальная

2. Туберальная анестезия блокирует ветви:

Номер правильного ответа: 3

- 1) передние верхние альвеолярные
- 2) средние верхние альвеолярные
- 3) задние верхние альвеолярные
- 4) глазничного нерва
- 5) носонебного нерва

3. Нижняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва:

Номер правильного ответа: 3

- 1) I
- 2) II
- 3) III
- 4) IV
- 5) V

4. Местным осложнением при обезболивании является:

Номер правильного ответа: 2

- 1) обморок
- 2) контрактура нижней челюсти
- 3) анафилактический шок
- 4) коллапс
- 5) отек Квинке

5. Общим осложнением при обезболивании является:

Номер правильного ответа: 3

- 1) кровотечение
- 2) контрактура
- 3) обморок
- 4) некроз
- 5) гематома

6. Депо анестетика при мандибулярной анестезии создают у отверстия:

Номер правильного ответа: 4

- 1) большого небного
- 2) резцового
- 3) подглазничного
- 4) нижнечелюстного
- 5) подбородочного

7. Инфраорбитальная анестезия проводится у отверстия:

Номер правильного ответа: 3

- 1) большого небного
- 2) резцового
- 3) подглазничного
- 4) нижнечелюстного
- 5) ментального

8. Вазоконстрикторы вызывают:

Номер правильного ответа: 2

- 1) расширение сосудов
- 2) сужение сосудов

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Первая категория.

- 3) гиперемии кожных покровов
- 4) парестезии
- 5) анальгезию

9. Зона иннервации носо-небного нерва:

Номер правильного ответа: 2

- 1) слизистая оболочка с вестибулярной стороны в области резцов
- 2) слизистая оболочка, твердое небо у резцов, до клыков
- 3) зубы верхней челюсти от клыка до клыка
- 4) альвеолярный отросток верхней челюсти
- 5) слизистая оболочка щеки

10. Депо анестетика при мандибулярной анестезии создают у отверстия:

Номер правильного ответа: 4

- 1) большого небного
- 2) резцового
- 3) подглазничного
- 4) нижнечелюстного
- 5) подбородочного

11. Для удаления зубов и корней применяются элеваторы конструкции:

Номер правильного ответа: 1

- 1) прямой, угловой
- 2) S-образной
- 3) клювовидной
- 4) конусовидной
- 5) байонетной

12. Врач при удалении правых премоляров и моляров нижней челюсти находится от больного:

Номер правильного ответа: 2

- 1) спереди и слева
- 2) справа и сзади
- 3) сзади и слева
- 4) справа и спереди
- 5) спереди

13. Перед операцией удаления зуба щипцами хирург проводит манипуляцию:

Номер правильного ответа: 3

- 1) люксацию
- 2) фиксацию
- 3) сепарацию
- 4) тракцию
- 5) пальпацию

14. Для удаления нижних моляров используют щипцы:

Номер правильного ответа: 1

- 2) клювовидные без шипов
- 3) штыковидные
- 4) прямые
- 5) S-образные

15. Для удаления верхних премоляров используют щипцы:

Номер правильного ответа: 3

- 2) S-образные с шипом
- 3) S-образные без шипа
- 4) клювовидные
- 5) байонетные

16. Заключительным этапом при удалении корней зубов является:

Номер правильного ответа: 4

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Первая категория.

- 2) тракция
- 3) сепарация
- 4) кюретаж
- 5) люксация

17. Показанием к плановому удалению зуба является:

Номер правильного ответа: 3

- 2) острый периостит
- 3) подвижность зуба 3 степени
- 4) хронический пульпит
- 5) острый пульпит

18. Показанием для цистэктомии радикулярных кист челюстей является:

Номер правильного ответа: 3

- 2) прорастание кисты в верхнечелюстную пазуху
- 3) небольшие размеры (до 3 зубов в полости)
- 4) большие размеры (более 3 зубов в полости)
- 5) деструкция наружной кортикальной пластинки челюсти

19. Анатомическим ориентиром при проведении мандибулярной анестезии внутриворотным способом является:

Номер правильного ответа: 4

- 2) височный гребешок
- 3) позадиомолярная ямка
- 4) крыловидночелюстная складка
- 5) премоляры

20. Прямыми щипцами удаляют:

Номер правильного ответа: 4

- 2) премоляры
- 3) зубы мудрости
- 4) резцы верхней челюсти
- 5) резцы нижней челюсти

21. Осложнения, возникающие во время операции удаления зуба:

Номер правильного ответа: 5

- 2) периостит
- 3) альвеолит
- 4) остеомиелит
- 5) перелом коронки или корня удаляемого зуба

22. Основным методом лечения слюннокаменной болезни является:

Номер правильного ответа: 5

- 2) химиотерапия
- 3) гормонотерапия
- 4) аутогемотерапия
- 5) хирургическое вмешательство

23. Основным дополнительным методом исследования в диагностике опухолей слюнных желез является:

Номер правильного ответа: 3

- 2) цитология
- 3) ультразвуковое исследование
- 4) сцинтиграфия
- 5) термовизиография

24. Этиологическим фактором в развитии злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта является:

Номер правильного ответа: 4

- 2) частичная адентия

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Первая категория.

- 3) массивные зубные отложения
- 4) хроническая травма слизистой оболочки
- 5) заболевания желудочно-кишечного тракта

25. Под онкологической настороженностью понимают знание:

Номер правильного ответа: 1

- 2) препаратов для лечения
- 3) профессиональных вредностей
- 4) допустимых доз лучевой терапии
- 5) расположения онкологических служб

26. К хирургическим методам лечения злокачественных новообразований челюстно-лицевой области относят:

Номер правильного ответа: 3

- 2) лучевую терапию
- 3) иссечение опухоли
- 4) комбинированное лечение
- 5) симптоматическую терапию

27. В результате нарушения развития эмалевого органа в челюстных костях образуется киста:

Номер правильного ответа: 3

- 2) радикулярная
- 3) фолликулярная
- 4) назоальвеолярная
- 5) резцового канала

28. Основным методом лечения кист челюстей большого размера является:

Номер правильного ответа: 1

- 2) цистэктомия
- 3) криодеструкция
- 4) частичная резекция челюсти
- 5) половинная резекция челюсти

29. Подготовка к операции цистэктомии включает пломбирование:

Номер правильного ответа: 1

- 2) всех зубов челюсти
- 3) зубов-антагонистов
- 4) рядом расположенных зубов
- 5) ментального канала

30. Распространенность опухоли, ее метастазирование наиболее точно оценивает классификация:

Номер правильного ответа: 1

- 2) клиническая
- 3) пятибалльная
- 4) онкологического центра
- 5) гистологическая

31. Этика – это:

Номер правильного ответа: 2

- 2) учение о морали

32. Деонтология – это:

Номер правильного ответа: 1

- 1) учение о долге одного человека перед другим и обществом в целом
- 2) учение о морали
- 3) учение о взаимоотношениях врача и больного

33. Правовой базой обязательного медицинского страхования являются следующие документы, кроме

Номер правильного ответа: 3

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Первая категория.

- 1) Закона РФ «О медицинском страховании граждан»
- 2) Основ законодательства об охране здоровья граждан дополнения и изменения к Закону «О медицинском страховании»
- 3) Закона «О санитарно-эпидемическом благополучии населения»

34. Источниками финансирования здравоохранения в настоящее время являются

Номер правильного ответа: 4

- 1) государственный бюджет
- 2) средства медицинского страхования
- 3) доходы от платных услуг населения
- 4) все вышеперечисленное

35. К основным методам обследования относятся:

Номер правильного ответа: 2

- 1) опрос, рентгенография
- 2) опрос, осмотр
- 3) осмотр, ЭОД
- 4) ЭОД, рентгенография
- 5) перкуссия, ЭОД

36. Слизистая оболочка полости рта в норме:

Номер правильного ответа: 3

- 1) бледного цвета, сухая
- 2) бледно-розового цвета, сухая
- 3) бледно-розового цвета, равномерно увлажнена
- 4) ярко-красного цвета, обильно увлажнена
- 5) гиперемирована, отечна

37. Осмотр пациента начинают с:

Номер правильного ответа: 3

- 1) заполнения зубной формулы
- 2) определения прикуса
- 3) внешнего осмотра
- 4) осмотра зубных рядов
- 5) перкуссии зубов

38. При пальпации поднижнечелюстных лимфатических узлов голова пациента должна быть:

Номер правильного ответа: 4

- 1) отклонена назад
- 2) отклонена влево
- 3) отклонена вправо
- 4) наклонена вперед
- 5) отклонена назад и влево

39. Глубина десневого желобка равна (мм):

Номер правильного ответа: 1

- 1) 0,1-0,2
- 2) 0,5-1
- 3) 2-3
- 4) 3-4
- 5) 4-5

40. При внешнем осмотре лица пациента врач отмечает:

Номер правильного ответа: 2

- 1) тургор кожи, цвет глаз
- 2) симметрию лица, носогубные складки, цвет кожи
- 3) форму носа, цвет глаз
- 4) пигментные пятна, цвет волос
- 5) целостность зубного ряда

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Первая категория.

41. Вид инфильтрационной анестезии, используемой в полости рта:

Номер правильного ответа: 3

- 1) подкожная
- 2) интубационная
- 3) интралигаментарная
- 4) эпидуральная
- 5) внутривенная

42. Клинические ситуации, указывающие на необходимость общего обезболивания:

Номер правильного ответа: 1

- 1) аллергические реакции на анестетики
- 2) множественный кариес зубов
- 3) высокая температура
- 4) подвижность зубов
- 5) повышенное АД

43. Из полости черепа нижнечелюстной нерв выходит через:

Номер правильного ответа: 1

- 1) овальное отверстие
- 2) круглое отверстие
- 3) подглазничное отверстие
- 4) верхнеглазничную щель
- 5) нижнечелюстной канал

44. Анестетики на основе мепивакаина относятся к группе:

Номер правильного ответа: 2

- 1) сложных эфиров
- 2) амидов
- 3) щелочей
- 4) спиртов
- 5) кислот

45. Направление иглы при блокаде большого небного нерва:

Номер правильного ответа: 2

- 1) кверху, кзади, кнутри
- 2) кверху, кзади, кнаружи
- 3) книзу, кзади, кнутри
- 4) книзу, кзади, кнаружи
- 5) кверху, вперед, кнутри

46. Передние и средние верхние альвеолярные нервы выключаются анестезией:

Номер правильного ответа: 3

- 1) мандибулярной
- 2) торусальной
- 3) инфраорбитальной
- 4) туберальной
- 5) по ГоуГейтсу

47. При местном обезболивании выключается болевой синдром:

Номер правильного ответа: 3

- 1) психоэмоциональный
- 2) вегетативный
- 3) сенсорный
- 4) двигательный
- 5) рефлекторный

48. К методу инфильтрационной анестезии относится:

Номер правильного ответа: 2

- 1) мандибулярная
- 2) субпериостальная

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Первая категория.

- 3) инфраорбитальная
- 4) резцовая
- 5) ментальная

49. Скос иглы при инъекционном обезболивании направляется к кости под углом (в градусах):

Номер правильного ответа: 4

- 1) 90
- 2) 60-70
- 3) 50-55
- 4) 30-45
- 5) 10-20

50. Во время коллапса кожные покровы:

Номер правильного ответа: 2

- 1) сухие, бледные
- 2) влажные, бледные
- 3) сухие, гиперемированные
- 4) влажные, гиперемированные
- 5) нормальные

51. Количество толчков в одну минуту при проведении непрямого массажа сердца:

Номер правильного ответа: 2

- 1) 30
- 2) 60
- 3) 90
- 4) 75
- 5) 120

52. При проведении непрямого массажа сердца руки реаниматора располагаются на:

Номер правильного ответа: 3

- 1) эпигастрии
- 2) нижней трети грудины
- 3) средней трети грудины
- 4) яремной вырезки
- 5) боковой поверхности груди

53. Наркоз, используемый при длительных и травматичных операциях:

Номер правильного ответа: 4

- 1) масочный
- 2) внутривенный
- 3) электронаркоз
- 4) эндотрахеальный
- 5) внутриартериальный

54. Жидкое наркотическое средство, используемое для ингаляционного наркоза:

Номер правильного ответа: 1

- 1) фторотан
- 2) калипсол
- 3) циклопропан
- 4) закись азота
- 5) баралгин

55. Вид инфильтрационной анестезии, используемой в полости рта:

Номер правильного ответа: 3

- 1) подкожная
- 2) интубационная
- 3) интралигаментарная
- 4) эпидуральная
- 5) внутривенная

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Первая категория.

56. Клинические ситуации, указывающие на необходимость общего обезболивания:

Номер правильного ответа: 1

- 1) аллергические реакции на анестетики
- 2) множественный кариес зубов
- 3) высокая температура
- 4) подвижность зубов
- 5) повышенное АД

57. При удалении резцов нижней челюсти применяется анестезия:

Номер правильного ответа: 3

- 1) палатинальная
- 2) инфраорбитальная
- 3) инфильтрационная с оральной и вестибулярной стороны
- 4) резцовая и инфильтрационная с вестибулярной стороны
- 5) туберальная

58. При удалении премоляров нижней челюсти применяется анестезия:

Номер правильного ответа: 3

- 1) инфильтрационная
- 2) резцовая
- 3) торусальная
- 4) палатинальная
- 5) туберальная

59. При проведении разреза на небе в области верхних резцов рекомендуется анестезия:

Номер правильного ответа: 2

- 1) палатинальная
- 2) резцовая
- 3) подглазничная
- 4) туберальная
- 5) торусальная

60. При проведении разреза с вестибулярной стороны в области верхних моляров наилучший эффект обезболивания достигается при анестезии:

Номер правильного ответа: 1

- 1) туберальной
- 2) резцовой
- 3) палатинальной
- 4) подглазничной
- 5) ментальной

61. Из полости черепа верхнечелюстной нерв выходит через:

Номер правильного ответа: 2

- 1) овальное отверстие в подвисочную ямку
- 2) круглое отверстие в крылонебную ямку
- 3) foramen infraorbitale в fossa canina
- 4) верхнеглазничную щель в глазницу
- 5) ментальное отверстие

62. Из полости черепа нижнечелюстной нерв выходит через:

Номер правильного ответа: 1

- 1) овальное отверстие
- 2) круглое отверстие
- 3) подглазничное отверстие
- 4) верхнеглазничную щель
- 5) нижнечелюстной канал

63. Анестетики на основе мепивакаина относятся к группе:

Номер правильного ответа: 2

- 1) сложных эфиров

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Первая категория.

- 2) амидов
- 3) щелочей
- 4) спиртов
- 5) кислот

64. Направление иглы при проведении инфраорбитальной анестезии:

Номер правильного ответа: 2

- 1) кверху, кзади, кнутри
- 2) кверху, кзади, кнаружи
- 3) книзу, кзади, кнутри
- 4) книзу, кзади, кнаружи
- 5) кверху, вперед, наружу

65. Направление иглы при блокаде большого небного нерва:

Номер правильного ответа: 2

- 1) кверху, кзади, кнутри
- 2) кверху, кзади, кнаружи
- 3) книзу, кзади, кнутри
- 4) книзу, кзади, кнаружи
- 5) кверху, вперед, кнутри

66. Местным осложнением при проводниковом обезболивании является:

Номер правильного ответа: 1

- 1) гематома
- 2) коллапс
- 3) обморок
- 4) анафилактический шок
- 5) отек Квинке

67. Анестезия по Вайсблату блокирует ветви тройничного нерва:

Номер правильного ответа: 2

- 1) I и II
- 2) II и III
- 3) I и III
- 4) II и IV
- 5) I и IV

68. В зону иннервации ментального нерва входят:

Номер правильного ответа: 3

- 1) моляры
- 2) альвеолярный отросток в области моляров
- 3) подбородок, губа, резцы, клыки и премоляры нижней челюсти
- 4) костная ткань ветви нижней челюсти
- 5) верхняя губа

69. Нижний луночковый нерв блокируется при анестезии:

Номер правильного ответа: 1

- 1) мандибулярной
- 2) ментальной
- 3) инфраорбитальной
- 4) туберальной
- 5) палатинальной

70. Передние и средние верхние альвеолярные нервы выключаются анестезией:

Номер правильного ответа: 3

- 1) мандибулярной
- 2) торусальной
- 3) инфраорбитальной
- 4) туберальной
- 5) по Гоу-Гейтсу

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Первая категория.

71. В зону иннервации язычного нерва входит:

Номер правильного ответа: 2

- 1) задняя треть языка
- 2) передние 2/3 языка
- 3) слизистая оболочка глотки
- 4) слизистая оболочка переходной складки
- 5) кончик языка

72. Зона иннервации средних верхних альвеолярных ветвей подглазничного нерва:

Номер правильного ответа: 4

- 1) премоляры нижней челюсти
- 2) моляры верхней челюсти
- 3) моляры нижней челюсти
- 4) премоляры верхней челюсти
- 5) резцы верхней челюсти

73. В зону иннервации передних верхних альвеолярных ветвей подглазничного нерва входят зубы:

Номер правильного ответа: 1

- 1) фронтальные верхней челюсти
- 2) фронтальные нижней челюсти,
- 3) жевательные верхней челюсти
- 4) жевательные нижней челюсти
- 5) премоляры нижней челюсти

74. В зону иннервации нижнелуночкового нерва входят:

Номер правильного ответа: 2

- 1) зубы верхней челюсти
- 2) зубы нижней челюсти
- 3) передние 2/3 языка
- 4) небо
- 5) слизистая щеки

75. К видам общего обезболивания относят:

Номер правильного ответа: 3

- 1) внутривенное
- 2) спонгиозное
- 3) нейролептаналгезию
- 4) интратригемальное
- 5) проводниковое

76. К методу инфильтрационной анестезии относится:

Номер правильного ответа: 2

- 1) мандибулярная
- 2) субпериостальная
- 3) инфраорбитальная
- 4) резцовая
- 5) ментальная

77. Для премедикации применяют препараты:

Номер правильного ответа: 1

- 1) малые транквилизаторы, анальгетики, гипосенсибилизирующие вещества
- 2) малые транквилизаторы, антибиотики, гипосенсибилизирующие вещества
- 3) малые транквилизаторы, диуретики, спазмолитики
- 4) малые транквилизаторы, диуретики, спазмолитики, гипосенсибилизирующие вещества
- 5) анальгетики и антибиотики

78. При местном обезболивании выключается болевой синдром:

Номер правильного ответа: 3

- 1) психоэмоциональный

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Первая категория.

- 2) вегетативный
- 3) сенсорный
- 4) двигательный
- 5) рефлекторный

79. Скос иглы при инъекционном обезболивании направляется к кости под углом (в градусах):

Номер правильного ответа: 4

- 1) 90
- 2) 60-70
- 3) 50-55
- 4) 30-45
- 5) 10-20

80. Блокада носо-небного нерва осуществляется у отверстия:

Номер правильного ответа: 2

- 1) большого небного
- 2) резцового
- 3) подглазничного
- 4) нижнечелюстного
- 5) ментального

81. Врач при удалении левых премоляров и моляров нижней челюсти находится от больного:

Номер правильного ответа: 1

- 1) спереди и справа
- 2) справа и сзади
- 3) сзади и слева
- 4) слева и спереди
- 5) спереди

82. Для удаления нижних резцов и клыков используют инструменты:

Номер правильного ответа: 1

- 1) клювовидные щипцы
- 2) прямые щипцы
- 3) S-образные щипцы
- 4) штыковидные щипцы
- 5) прямые элеваторы

83. Для удаления верхних моляров используют инструменты:

Номер правильного ответа: 2

- 1) прямые щипцы
- 2) S-образные щипцы с шипом
- 3) S-образные щипцы без шипа
- 4) клювовидные щипцы
- 5) элеваторы

84. Для обработки лунки после удаления зуба применяют:

Номер правильного ответа: 2

- 1) элеватор
- 2) кюретажную ложку
- 3) зонд
- 4) серповидную гладилку
- 5) зеркало

85. При операции удаления корней центральных резцов верхней челюсти применяется:

Номер правильного ответа: 2

- 1) штыковидный элеватор
- 2) прямые щипцы со сходящимися щечками
- 3) клювовидные щипцы со сходящими щечками
- 4) S-образные щипцы
- 5) клювовидные щипцы с несходящими щечками

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Первая категория.

86. При удалении шестого зуба нижней челюсти производят первое движение:

Номер правильного ответа: 4

- 1) ротацию
- 2) ротацию и люксацию
- 3) люксацию в язычную сторону
- 4) люксацию в щечную сторону
- 5) тракцию

87. Для удаления правых верхних моляров с сохраненной коронкой предназначены щипцы:

Номер правильного ответа: 3

- 1) S-образные с шипом справа
- 2) S-образные с несходящимися щечками без шипа
- 3) S-образные с шипом слева
- 4) штыковидные
- 5) клювовидные

88. Для удаления корней верхних моляров предназначены щипцы:

Номер правильного ответа: 4

- 1) S-образные с несходящимися щечками
- 2) S-образные с шипами
- 3) прямые со сходящимися щечками
- 4) штыковидные
- 5) прямые с несходящими щечками

89. При удалении второго моляра нижней челюсти производят первое движение:

Номер правильного ответа: 3

- 1) ротацию
- 2) ротацию и люксацию
- 3) люксацию в язычную сторону
- 4) люксацию в щечную сторону
- 5) тракцию

90. Первым движением при удалении шестого зуба верхней челюсти является:

Номер правильного ответа: 3

- 1) ротация
- 2) люксация и ротация
- 3) люксация в небную сторону
- 4) люксация в щечную сторону
- 5) люксация в обе стороны

91. Для удаления моляров на нижней челюсти при затрудненном открывании полости рта применяются:

Номер правильного ответа: 1

- 1) щипцы изогнутые по плоскости
- 2) клювовидные щипцы со сходящимися щечками
- 3) клювовидные щипцы с шипами
- 4) элеватор Леклюза
- 5) байонетные щипцы

92. Общим обезболиванием является:

Номер правильного ответа: 2

- 1) атаралгезия
- 2) эндотрахеальный наркоз
- 3) проводниковая анестезия
- 4) вагосимпатическая блокада
- 5) инфильтрационная анестезия

93. Общим обезболиванием является:

Номер правильного ответа: 1

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Первая категория.

- 1) внутривенный наркоз
- 2) стволовая анестезия
- 3) спинальная анестезия
- 4) паранефральная блокада
- 5) вагосимпатическая блокада

94. Жидкое наркотическое средство, используемое для ингаляционного наркоза:

Номер правильного ответа: 1

- 1) фторотан
- 2) калипсол
- 3) циклопропан
- 4) закись азота
- 5) баралгин

95. Способом неингаляционного наркоза является:

Номер правильного ответа: 2

- 1) масочный
- 2) внутривенный
- 3) эндотрахеальный
- 4) внутриартериальный
- 5) внутримышечный

96. Наркоз, используемый при длительных и травматичных операциях:

Номер правильного ответа: 4

- 1) масочный
- 2) внутривенный
- 3) электронаркоз
- 4) эндотрахеальный
- 5) внутриартериальный

97. При нейролептанальгезии препараты вводят:

Номер правильного ответа: 2

- 1) энтерально
- 2) внутривенно
- 3) ингаляционно
- 4) внутримышечно
- 5) внутриартериально

98. Верхнечелюстной нерв выходит из полости черепа через:

Номер правильного ответа: 4

- 1) сонное отверстие
- 2) овальное отверстие
- 3) остистое отверстие
- 4) круглое отверстие
- 5) слепое отверстие

99. Нижнечелюстной нерв выходит из полости черепа через отверстие:

Номер правильного ответа: 3

- 1) сонное
- 2) круглое
- 3) овальное
- 4) остистое
- 5) слепое

100. При передозировке адреналина больному необходимо ввести:

Номер правильного ответа: 1

- 1) внутривенно 1 мл атропина
- 2) внутривенно 1 мл мезатона
- 3) внутримышечно 1 мл норадреналина
- 4) внутримышечно баралгин

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Первая категория.

5) внутривенно героин

101. Во время коллапса кожные покровы:

Номер правильного ответа: 2

- 1) сухие, бледные
- 2) влажные, бледные
- 3) сухие, гиперемированные
- 4) влажные, гиперемированные
- 5) нормальные

102. Пульс во время коллапса:

Номер правильного ответа: 1

- 1) частый, нитевидный
- 2) нитевидный, редкий
- 3) частый, хорошего наполнения
- 4) редкий, хорошего наполнения
- 5) нормальный

103. Количество толчков в одну минуту при проведении непрямого массажа сердца:

Номер правильного ответа: 2

- 1) 30
- 2) 60
- 3) 90
- 4) 75
- 5) 120

104. При проведении непрямого массажа сердца руки реаниматора располагаются на:

Номер правильного ответа: 3

- 1) эпигастрии
- 2) нижней трети грудины
- 3) средней трети грудины
- 4) яремной вырезки
- 5) боковой поверхности груди

105. S-образными щипцами без шипов удаляют:

Номер правильного ответа: 4

- 1) корни зубов
- 2) моляры нижней челюсти
- 3) моляры верхней челюсти
- 4) премоляры верхней челюсти
- 5) 3-й моляры нижней челюсти

106. S-образными щипцами с шипом удаляют:

Номер правильного ответа: 3

- 1) резцы
- 2) 3-й моляры
- 3) моляры верхней челюсти
- 4) премоляры верхней челюсти
- 5) 3-й моляры нижней челюсти

107. Штыковидными щипцами удаляют:

Номер правильного ответа: 5

- 1) резцы нижней челюсти
- 2) моляры верхней челюсти
- 3) премоляры нижней челюсти
- 4) 3-й моляры нижней челюсти
- 5) корни и премоляры верхней челюсти

108. Клювовидными щипцами со сходящимися щечками удаляют:

Номер правильного ответа: 5

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Первая категория.

- 1) резцы нижней челюсти
- 2) моляры нижней челюсти
- 3) премоляры верхней челюсти
- 4) 3-й моляры верхней челюсти
- 5) корни зубов нижней челюсти

109. Дополнительный инструмент для удаления корней зубов нижней и верхней челюстей:

Номер правильного ответа: 1

- 1) гладилка
- 2) прямые щипцы
- 3) иглодержатель
- 4) крючок Лимберга
- 5) элеватор Карапетяна

110. Ведущую роль в развитии острого сиалоаденита играет:

Номер правильного ответа: 3

- 1) острый стоматит
- 2) герпетический стоматит
- 3) рефлекторная гипосаливация
- 4) рефлекторная гиперсаливация
- 5) нарушение прикуса

111. Стимулирует слюноотделение:

Номер правильного ответа: 4

- 1) атропин
- 2) йодолипол
- 3) хлоргексидин
- 4) йодистый калий
- 5) хлористый кальций

112. Хронический интерстициальный сиалоаденит характеризуется:

Номер правильного ответа: 4

- 1) расплавлением стромы
- 2) тотальным отеком паренхимы
- 3) образованием мелких гнойных полостей
- 4) разрастанием межзубочной соединительной ткани
- 5) тромбозом сосудов

113. Для диагностики конкремента в вартоновом протоке выполняют:

Номер правильного ответа: 3

- 1) ортопантограмму
- 2) рентгенограмму тела нижней челюсти
- 3) внутривартовую рентгенограмму дна полости рта
- 4) рентгенограмму поднижнечелюстной слюнной железы
- 5) томографию поднижнечелюстной слюнной железы

114. Основным хирургическим методом лечения при наличии конкремента поднижнечелюстной слюнной железы является:

Номер правильного ответа: 1

- 1) экстирпация железы
- 2) удаление конкремента
- 3) пластика выводного протока
- 4) рассечение стеноза протока
- 5) футлярно-фасциальное иссечение клетчатки шеи по верхнему варианту

115. Одним из этапов удаления поднижнечелюстной слюнной железы является временная перевязка:

Номер правильного ответа: 2

- 1) стеноза протока
- 2) вартонова протока

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Первая категория.

- 3) общей сонной артерии
- 4) верхней щитовидной артерии
- 5) краевой ветви лицевого нерва

116. Полость ретенционной кисты слюнной железы заполнена:

Номер правильного ответа: 1

- 1) слюной
- 2) детритом
- 3) грануляциями
- 4) холестеатомными массами
- 5) кристаллами холестерина

117. Основным методом лечения кист слюнных желез является:

Номер правильного ответа: 5

- 1) физиотерапия
- 2) химиотерапия
- 3) гормонотерапия
- 4) аутогемотерапия
- 5) хирургическое вмешательство

118. Ранулой называется:

Номер правильного ответа: 2

- 1) киста околоушной слюнной железы
- 2) киста подъязычной слюнной железы
- 3) опухоль подъязычной слюнной железы
- 4) киста поднижнечелюстной слюнной железы
- 5) опухоль поднижнечелюстной слюнной железы

119. Кисту поднижнечелюстной слюнной железы необходимо дифференцировать с:

Номер правильного ответа: 3

- 1) паротитом
- 2) актиномикозом
- 3) боковой кистой шеи
- 4) капиллярной гемангиомой
- 5) воспалительным заболеванием

120. Клиническая картина доброкачественных опухолей слюнных желез характеризуется:

Номер правильного ответа: 5

- 1) отсутствием изменений
- 2) незначительным уплотнением железы
- 3) болью, увеличением железы, гипосаливацией
- 4) болью, уменьшением железы, гиперсаливацией
- 5) безболезненным узлом в железе, не спаянным с окружающими тканями

121. Клиническая картина злокачественных опухолей слюнных желез характеризуется:

Номер правильного ответа: 5

- 1) отсутствием изменений
- 2) болью, уменьшением железы
- 3) незначительным уплотнением железы
- 4) болью, увеличением железы, гиперсаливацией
- 5) ограниченным подвижным слабоболлезненным узлом в железе

122. Ранним местным осложнением после удаления опухоли околоушной слюнной железы является:

Номер правильного ответа: 5

- 1) парестезия
- 2) ксеростомия
- 3) парез мышц языка
- 4) неврит ментального нерва
- 5) парез мимической мускулатуры

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Первая категория.

123. При подозрении на злокачественную опухоль челюстно-лицевой области больного необходимо направить к:

Номер правильного ответа: 5

- 1) районному онкологу
- 2) специалисту-радиологу
- 3) участковому терапевту
- 4) хирургу общего профиля,
- 5) хирургу-стоматологу

124. Больной с диагнозом «злокачественное новообразование челюстно-лицевой области» должен быть направлен к:

Номер правильного ответа: 1

- 1) районному онкологу
- 2) специалисту-радиологу
- 3) участковому терапевту
- 4) хирургу общего профиля
- 5) хирургу-стоматологу

125. Чем состояние страха и тревожности вредно для организма:

Номер правильного ответа: 1

- 1) Выброс в кровяное русло катехоламинов и кортикостероидов, развитием осложнений, учащением сердцебиения
- 2) Развитием осложнений
- 3) Появлением обильного пота
- 4) Учащением сердцебиения

126. В какой период стоматологического вмешательства чаще всего возникают осложнения соматического характера:

Номер правильного ответа: 3

- 1) Во время проведения диагностики
- 2) Во время лечения
- 3) Во время проведения инъекции
- 4) Через несколько дней после лечения

127. Какие официальные анестетики есть в России для применения в стоматологии:

Номер правильного ответа: 4

- 1) Лидокаин
- 2) Ультракаин™
- 3) Ультракаин™, Убистезин™, Скандонест™, Лидокаин
- 4) Артикаин, мепивакаин

128. Какими объективными диагностическими тестами (приборами) можно быстро определить и оценить состояние пациента:

Номер правильного ответа: 3

- 1) Аппарат для измерения АД
- 2) Аппарат для измерения АД, термометр
- 3) Аппарат для измерения АД, термометр, глюкометр, коагулометр
- 4) Аппарат для измерения АД, глюкометр

129. Укажите нормальные показатели глюкозы крови:

Номер правильного ответа: 2

- 1) 7 ммоль/л
- 2) 3,3 - 5,5 ммоль/л
- 3) 6,6 ммоль/л
- 4) 12 ммоль/л

130. Укажите показатели МНО, при которых стоматологическое вмешательство невозможно:

Номер правильного ответа: 2

- 1) До 1,5

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Первая категория.

- 2) Более 1,5
- 3) Более 3
- 4) Значения не имеет

131. Можно ли проводить хирургическое вмешательство пациенту, который ежедневно принимает ацетилсалициловую кислоту:

Номер правильного ответа: 1

- 1) Да
- 2) Только в случае острой боли
- 3) В зависимости от объёма вмешательства
- 4) Нет

132. Возможно ли удаление зуба в плановом порядке у пациента, который получает инъекции гепарина и в какие сроки:

Номер правильного ответа: 2

- 1) Нет
- 2) Да, с отменой гепарина за 5-6 часов до процедуры, с обязательным контролем МНО
- 3) Да, с отменой гепарина за 12 часов до процедуры, с обязательным контролем МНО
- 4) В зависимости от сложности удаления

133. Возможно ли удаление зуба в плановом порядке у пациента, который получает инъекции низкомолекулярного гепарина и в какие сроки:

Номер правильного ответа: 3

- 1) Нет
- 2) Да, с отменой гепарина за 5-6 часов до процедуры, с обязательным контролем МНО
- 3) Да, с отменой гепарина за 12 часов до процедуры, с обязательным контролем МНО
- 4) В зависимости от сложности удаления

134. Почему при подозрении на инсульт нельзя давать лекарственные средства, снижающие артериальное давление:

Номер правильного ответа: 2

- 1) из-за сильной головной боли во время снижения давления
- 2) ухудшение кровотока и расширение очага повреждения мозга
- 3) из-за возможных аллергических реакций
- 4) давление должно нормализоваться самостоятельно

135. Профилактика судорожного синдрома:

Номер правильного ответа: 3

- 1) перед манипуляциями ввести В/В конвулекс 5 мл, разведенного на физиологическом растворе натрия хлорида
- 2) после выполнения анестезии ввести В/В раствор магнезии сульфата 25%-10 мл
- 3) Вмешательство должно быть щадящим: приступ может быть спровоцирован даже осмотром полости рта и подготовка к инъекции местного анестетика
- 4) Все вышеперечисленное верно

136. Необходимо ли вызывать скорую помощь если судорожный синдром купировался самостоятельно, и пациент находится в сознании

Номер правильного ответа: 2

- 1) Нет
- 2) Да
- 3) Если пациент просит
- 4) Если для этого есть время у врача

137. Какие опасные осложнения могут развиваться у пациентов, страдающих сахарным диабетом:

Номер правильного ответа: 2

- 1) Нарушением водно-солевого обмена
- 2) Опасен развитием декомпенсированных состояний: гипогликемическая и гипергликемическая комы
- 3) Осложнений не бывает
- 4) Может развиваться почечная недостаточность

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Первая категория.

138. Какие профилактические меры должен предпринять стоматолог при наличии в анамнезе у пациента сахарного диабета:

Номер правильного ответа: 3

- 1) Никакие
- 2) Проветрить кабинет, провести влажную уборку
- 3) Измерить уровень глюкозы в крови пациента
- 4) Тщательно собрать общесоматический анамнез

139. Какие органы и системы повреждаются у пациентов, страдающих сахарным диабетом:

Номер правильного ответа: 2

- 1) ЦНС
- 2) ЦНС, сердце и крупные сосуды, периферическое кровообращение, периферическая нервная система, почки, глаза
- 3) Сердце и крупные сосуды
- 4) Глаза и почки

140. Какие цифры артериального давления считаются нормой:

Номер правильного ответа: 2

- 1) 170 – 160/100 – 90 мм.рт.ст.
- 2) 130-110/85-70 мм.рт.ст
- 3) 110 – 100/ 80-70 мм.рт.ст.
- 4) 125/80 мм.рт.ст.

141. Что такое острый коронарный синдром:

Номер правильного ответа: 2

- 1) Хроническое бронхолёгочное заболевание, проявляющееся обструкцией бронхиального дерева в результате бронхоспазма, воспаления и отёка слизистой оболочки, гиперсекреции железистого аппарата
- 2) Патологический процесс, при котором нарушается кровоснабжение миокарда
- 3) Диффузное воспаление печеночной ткани вследствие токсического, инфекционного или аутоиммунного процесса
- 4) Угрожающее жизни состояние, характеризующееся падением кровяного давления и ухудшением кровоснабжения жизненно важных органов

142. Чем отличается стенокардия от инфаркта:

Номер правильного ответа: 2

- 1) Не отличается
- 2) Являются частыми проявлениями патологии, называемой ишемической болезнью сердца (ИБС): хронической формой считается стенокардия, инфаркт – острой
- 3) Степенью эластичности сосудов
- 4) Интенсивностью болей

143. Опишите характерное действие гистамина:

Номер правильного ответа: 1

- 1) Является медиатором воспаления, аллергических реакций
- 2) Вызывает остановку дыхания
- 3) Вызывает кожные реакции
- 4) Является провокатором артериальной гипертензии

144. Назовите главный препарат для лечения анафилактического шока:

Номер правильного ответа: 2

- 1) Преднизолон
- 2) Адреналин 0,1% р-ор
- 3) Мепивакаин
- 4) Лидокаин

145. Пути введения адреналина при анафилактическом шоке:

Номер правильного ответа: 4

- 1) Внутривенно

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Первая категория.

- 2) Внутримышечно в наружную поверхность бедра
- 3) Адреналин в корень языка или трахею
- 4) Все вышеперечисленное верно

146. Причины нейротоксичности при использовании местной анестезии в стоматологии:

Номер правильного ответа: 4

- 1) Инъекция в сосуд
- 2) Передозировка
- 3) Реакция на вазоконстриктор, вазовагальная реакция
- 4) Все вышеперечисленное верно

147. Перечислите какие обследования необходимо назначить пациенту для профилактики анафилаксии:

Номер правильного ответа: 1

- 1) Лечить любые аллергические реакции, не увлекаться полипрагмазией
- 2) ЭКГ
- 3) Измерение АД
- 4) Измерение МНО

148. Как действует на кровеносные сосуды лидокаин:

Номер правильного ответа: 2

- 1) Сужает
- 2) Расширяет
- 3) Не влияет
- 4) Увеличивает проницаемость стенок сосудов

149. Для чего в местный анестетик добавляется адреналин:

Номер правильного ответа: 2

- 1) Удлинение времени действия анестетика
- 2) Сужение сосудов – снижение скорости всасывания- длительность действия
- 3) Расширение сосудов
- 4) Снижения концентрации анестетика

150. Назовите местный анестетик, который наиболее хорошо проникает в зону воспаления:

Номер правильного ответа: 3

- 1) Мепивакаин
- 2) Лидокаин
- 3) Артикаин
- 4) Убистезин™