

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Вторая категория.

1. Этика – это:

Номер правильного ответа: 2

- 1) учение о взаимоотношениях врача и больного
- 2) учение о морали

2. Деонтология – это:

Номер правильного ответа: 1

- 1) учение о долге одного человека перед другим и обществом в целом
- 2) учение о морали
- 3) учение о взаимоотношениях врача и больного

3. Является ли информирование добровольное согласие пациента (или доверенных лиц) необходимым предварительным условием медицинского вмешательства?

Номер правильного ответа: 1

- 1) да
- 2) нет

4. Обследование пациента начинают с применения методов:

Номер правильного ответа: 4

- 1) рентгенологических
- 2) лабораторных
- 3) термометрических
- 4) основных
- 5) цитологических

5. К основным методам обследования относятся:

Номер правильного ответа: 2

- 1) опрос, рентгенография
- 2) опрос, осмотр
- 3) осмотр, ЭОД
- 4) ЭОД, рентгенография
- 5) перкуссия, ЭОД

6. Опрос пациента начинается с выяснения:

Номер правильного ответа: 4

- 1) истории жизни
- 2) анамнеза заболевания
- 3) перенесенных заболеваний
- 4) жалоб
- 5) аллергоанамнеза

7. Слизистая оболочка полости рта в норме:

Номер правильного ответа: 3

- 1) бледного цвета, сухая
- 2) бледно-розового цвета, сухая
- 3) бледно-розового цвета, равномерно увлажнена
- 4) ярко-красного цвета, обильно увлажнена
- 5) гиперемирована, отечна

8. Осмотр пациента начинают с:

Номер правильного ответа: 3

- 1) заполнения зубной формулы
- 2) определения прикуса
- 3) внешнего осмотра
- 4) осмотра зубных рядов
- 5) перкуссии зубов

9. При обследовании лимфатических узлов применяют метод:

Номер правильного ответа: 3

- 1) перкуссии

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Вторая категория.

- 2) зондирования
- 3) пальпации
- 4) рентгенографии
- 5) аускультации

10. При пальпации поднижнечелюстных лимфатических узлов голова пациента должна быть:

Номер правильного ответа: 4

- 1) отклонена назад
- 2) отклонена влево
- 3) отклонена вправо
- 4) наклонена вперед
- 5) отклонена назад и влево

11. Подвижность зубов определяют с помощью инструмента:

Номер правильного ответа: 3

- 1) зеркала
- 2) углового зонда
- 3) пинцета
- 4) экскаватора
- 5) шпателя

12. Вид местной анестезии, используемой при стоматологических вмешательствах:

Номер правильного ответа: 2

- 1) интубационная
- 2) проводниковая
- 3) эпидуральная
- 4) внутривенная
- 5) масочная

13. Вид инфильтрационной анестезии, используемой в полости рта:

Номер правильного ответа: 3

- 1) подкожная
- 2) интубационная
- 3) интралигаментарная
- 4) эпидуральная
- 5) внутривенная

14. Клинические ситуации, указывающие на необходимость общего обезболивания:

Номер правильного ответа: 1

- 1) аллергические реакции на анестетики
- 2) множественный кариес зубов
- 3) высокая температура
- 4) подвижность зубов
- 5) повышенное АД

15. Из полости черепа нижнечелюстной нерв выходит через:

Номер правильного ответа: 1

- 1) овальное отверстие
- 2) круглое отверстие
- 3) подглазничное отверстие
- 4) верхнеглазничную щель
- 5) нижнечелюстной канал

16. Анестетики на основе мепивакаина относятся к группе:

Номер правильного ответа: 2

- 1) сложных эфиров
- 2) амидов
- 3) щелочей
- 4) спиртов
- 5) кислот

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Вторая категория.

17. Направление иглы при блокаде большого небного нерва:

Номер правильного ответа: 2

- 1) кверху, кзади, кнутри
- 2) кверху, кзади, кнаружи
- 3) книзу, кзади, кнутри
- 4) книзу, кзади, кнаружи
- 5) кверху, вперед, кнутри

18. Передние и средние верхние альвеолярные нервы выключаются анестезией:

Номер правильного ответа: 3

- 1) мандибулярной
- 2) торусальной
- 3) инфраорбитальной
- 4) туберальной
- 5) по Гоу-Гейтсу

19. Подбородочный нерв блокируется при анестезии:

Номер правильного ответа: 1

- 1) мандибулярной и ментальной
- 2) резцовой и инфраорбитальной
- 3) резцовой и туберальной
- 4) туберальной и палатинальной
- 5) инфраорбитальной и палатинальной

20. Местным осложнением при обезболивании является:

Номер правильного ответа: 2

- 1) обморок
- 2) контрактура нижней челюсти
- 3) анафилактический шок
- 4) коллапс
- 5) отек Квинке

21. Общим осложнением при обезболивании является:

Номер правильного ответа: 3

- 1) кровотечение
- 2) контрактура
- 3) обморок
- 4) некроз
- 5) гематома

22. К методу инфильтрационной анестезии относится:

Номер правильного ответа: 2

- 1) мандибулярная
- 2) субпериостальная
- 3) инфраорбитальная
- 4) резцовая
- 5) ментальная

23. При общем обезболивании происходит:

Номер правильного ответа: 1

- 1) обратимое торможение ЦНС
- 2) необратимое торможение ЦНС
- 3) блокада периферических нервных рецепторов
- 4) блокада основного нервного ствола
- 5) возбуждение ЦНС

24. Скол иглы при инъекционном обезболивании направляется к кости под углом (в градусах):

Номер правильного ответа: 4

- 1) 90

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Вторая категория.

- 2) 60-70
- 3) 50-55
- 4) 30-45
- 5) 10-20

25. В зону обезболивания верхней челюсти при инфраорбитальной анестезии входят:

Номер правильного ответа: 4

- 1) моляры
- 2) верхняя губа, крыло носа
- 3) 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, слизистая оболочка альвеолярного отростка с небной стороны
- 4) 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, слизистая оболочка альвеолярного отростка с вестибулярной стороны
- 5) слизистая оболочка неба

26. Во время коллапса кожные покровы:

Номер правильного ответа: 2

- 1) сухие, бледные
- 2) влажные, бледные
- 3) сухие, гиперемированные
- 4) влажные, гиперемированные
- 5) нормальные

27. Вид местной анестезии, используемой при стоматологических вмешательствах:

Номер правильного ответа: 2

- 1) интубационная
- 2) проводниковая
- 3) эпидуральная
- 4) внутривенная
- 5) масочная

28. Вид инфильтрационной анестезии, используемой в полости рта:

Номер правильного ответа: 3

- 1) подкожная
- 2) интубационная
- 3) интралигаментарная
- 4) эпидуральная
- 5) внутривенная

29. Клинические ситуации, указывающие на необходимость общего обезболивания:

Номер правильного ответа: 1

- 1) аллергические реакции на анестетики
- 2) множественный кариес зубов
- 3) высокая температура
- 4) подвижность зубов
- 5) повышенное АД

30. При удалении премоляров верхней челюсти применяют местную анестезию:

Номер правильного ответа: 1

- 1) инфильтрационную
- 2) торусальную
- 3) резцовую
- 4) мандибулярную
- 5) ментальную

31. При удалении моляров верхней челюсти применяют местную анестезию:

Номер правильного ответа: 3

- 1) торусальную
- 2) инфраорбитальную
- 3) туберальную
- 4) ментальную

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Вторая категория.

5) резцовую

32. При удалении резцов нижней челюсти применяется анестезия:

Номер правильного ответа: 3

- 1) палатинальная
- 2) инфраорбитальная
- 3) инфильтрационная с оральной и вестибулярной стороны
- 4) резцовая и инфильтрационная с вестибулярной стороны
- 5) туберальная

33. При удалении премоляров нижней челюсти применяется анестезия:

Номер правильного ответа: 3

- 1) инфильтрационная
- 2) резцовая
- 3) торусальная
- 4) палатинальная
- 5) туберальная

34. При удалении моляров нижней челюсти применяется анестезия:

Номер правильного ответа: 4

- 1) инфильтрационная
- 2) туберальная
- 3) ментальная
- 4) по Гоу-Гейтсу
- 5) палатинальная

35. Подъязычный нерв иннервирует:

Номер правильного ответа: 3

- 1) зубы верхней челюсти
- 2) слизистую оболочку неба
- 3) слизистую оболочку десны с язычной стороны
- 4) нижнюю губу и кожу подбородочной области
- 5) слизистую щеки

36. Анестетики на основе мепивакаина относятся к группе:

Номер правильного ответа: 2

- 1) сложных эфиров
- 2) амидов
- 3) щелочей
- 4) спиртов
- 5) кислот

37. Местным осложнением при проводниковом обезболивании является:

Номер правильного ответа: 1

- 1) гематома
- 2) коллапс
- 3) обморок
- 4) анафилактический шок
- 5) отек Квинке

38. Нижний луночковый нерв иннервирует:

Номер правильного ответа: 2

- 1) зубы верхней челюсти
- 2) зубы нижней челюсти
- 3) подъязычную область
- 4) 2/3 языка
- 5) слизистую щеки

39. В зону иннервации ментального нерва входят:

Номер правильного ответа: 3

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Вторая категория.

- 1) моляры
- 2) альвеолярный отросток в области моляров
- 3) подбородок, губа, резцы, клыки и премоляры нижней челюсти
- 4) костная ткань ветви нижней челюсти
- 5) верхняя губа

40. Подбородочный нерв блокируется при анестезии:

Номер правильного ответа: 1

- 1) мандибулярной и ментальной
- 2) резцовой и инфраорбитальной
- 3) резцовой и туберальной
- 4) туберальной и палатинальной
- 5) инфраорбитальной и палатинальной

41. Нижний луночковый нерв блокируется при анестезии:

Номер правильного ответа: 1

- 1) мандибулярной
- 2) ментальной
- 3) инфраорбитальной
- 4) туберальной
- 5) палатинальной

42. Задние верхние альвеолярные нервы выключаются анестезией:

Номер правильного ответа: 4

- 1) мандибулярной
- 2) ментальной
- 3) инфраорбитальной
- 4) туберальной
- 5) торусальной

43. Передние и средние верхние альвеолярные нервы выключаются анестезией:

Номер правильного ответа: 3

- 1) мандибулярной
- 2) торусальной
- 3) инфраорбитальной
- 4) туберальной
- 5) по Гоу-Гейтсу

44. В зону иннервации язычного нерва входит:

Номер правильного ответа: 2

- 1) задняя треть языка
- 2) передние 2/3 языка
- 3) слизистая оболочка глотки
- 4) слизистая оболочка переходной складки
- 5) кончик языка

45. Зона иннервации задних верхних альвеолярных ветвей верхнечелюстного нерва:

Номер правильного ответа: 4

- 1) кожа и слизистая щеки
- 2) альвеолярный отросток и моляры нижней челюсти
- 3) альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти
- 4) бугор, альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти
- 5) слизистая неба

46. Выключение язычного нерва осуществляется при анестезии:

Номер правильного ответа: 1

- 1) торусальной
- 2) туберальной
- 3) ментальной
- 4) инфраорбитальной

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Вторая категория.

5) палатинальной

47. Зона иннервации средних верхних альвеолярных ветвей подглазничного нерва:

Номер правильного ответа: 4

- 1) премоляры нижней челюсти
- 2) моляры верхней челюсти
- 3) моляры нижней челюсти
- 4) премоляры верхней челюсти
- 5) резцы верхней челюсти

48. В зону иннервации передних верхних альвеолярных ветвей подглазничного нерва входят зубы:

Номер правильного ответа: 1

- 1) фронтальные верхней челюсти
- 2) фронтальные нижней челюсти,
- 3) жевательные верхней челюсти
- 4) жевательные нижней челюсти
- 5) премоляры нижней челюсти

49. В зону иннервации нижнелуночкового нерва входят:

Номер правильного ответа: 2

- 1) зубы верхней челюсти
- 2) зубы нижней челюсти
- 3) передние 2/3 языка
- 4) небо
- 5) слизистая щеки

50. К методу инфильтрационной анестезии относится:

Номер правильного ответа: 2

- 1) мандибулярная
- 2) субпериостальная
- 3) инфраорбитальная
- 4) резцовая
- 5) ментальная

51. При общем обезболивании происходит:

Номер правильного ответа: 1

- 1) обратимое торможение ЦНС
- 2) необратимое торможение ЦНС
- 3) блокада периферических нервных рецепторов
- 4) блокада основного нервного ствола
- 5) возбуждение ЦНС

52. Для премедикации применяют препараты:

Номер правильного ответа: 1

- 1) малые транквилизаторы, анальгетики, гипосенсибилизирующие вещества
- 2) малые транквилизаторы, антибиотики, гипосенсибилизирующие вещества
- 3) малые транквилизаторы, диуретики, спазмолитики
- 4) малые транквилизаторы, диуретики, спазмолитики, гипосенсибилизирующие вещества
- 5) анальгетики, антибиотики

53. Вазоконстрикторы вызывают:

Номер правильного ответа: 2

- 1) расширение сосудов
- 2) сужение сосудов
- 3) гиперемии кожных покровов
- 4) парестезии
- 5) анальгезию

54. Депо анестетика при мандибулярной анестезии создают у отверстия:

Номер правильного ответа: 4

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Вторая категория.

- 1) большого небного
- 2) резцового
- 3) подглазничного
- 4) нижнечелюстного
- 5) подбородочного

55. Для удаления зубов применяются инструменты:

Номер правильного ответа: 3

- 1) зеркало, пинцет
- 2) пинцет, зонд
- 3) элеватор, щипцы
- 4) шпатель, пинцет
- 5) зеркало, зонд

56. Для удаления зубов и корней применяются элеваторы конструкции:

Номер правильного ответа: 1

- 1) прямой, угловой
- 2) S-образной
- 3) клювовидной
- 4) конусовидной
- 5) байонетной

57. Врач при удалении левых премоляров и моляров нижней челюсти находится от больного:

Номер правильного ответа: 1

- 1) спереди и справа
- 2) справа и сзади
- 3) сзади и слева
- 4) слева и спереди
- 5) спереди

58. Врач при удалении правых премоляров и моляров нижней челюсти находится от больного:

Номер правильного ответа: 2

- 1) спереди и слева
- 2) справа и сзади
- 3) сзади и слева
- 4) справа и спереди
- 5) спереди

59. Для удаления фронтальной группы зубов верхней челюсти применяются щипцы:

Номер правильного ответа: 2

- 1) прямые со сходящимися щечками
- 2) прямые с несходящимися щечками
- 3) S-образные с несходящимися щечками
- 4) клювовидные с несходящимися щечками
- 5) байонетные

60. Перед операцией удаления зуба щипцами хирург проводит манипуляцию:

Номер правильного ответа: 3

- 1) люксацию
- 2) фиксацию
- 3) сепарацию
- 4) тракцию
- 5) пальпацию

61. Для удаления нижних резцов и клыков используют инструменты:

Номер правильного ответа: 1

- 1) клювовидные щипцы
- 2) прямые щипцы
- 3) S-образные щипцы
- 4) штыковидные щипцы

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Вторая категория.

5) прямые элеваторы

62. Для удаления нижних премоляров используют щипцы:

Номер правильного ответа: 2

- 1) клювовидные с шипами
- 2) клювовидные без шипов
- 3) S-образные
- 4) прямые
- 5) байонетные (специальные)

63. Для удаления нижних моляров используют щипцы:

Номер правильного ответа: 1

- 1) клювовидные с шипами
- 2) клювовидные без шипов
- 3) штыковидные
- 4) прямые
- 5) S-образные

64. Для удаления верхних резцов и клыков используют щипцы:

Номер правильного ответа: 2

- 1) клювовидные без шипов
- 2) прямые
- 3) S-образные
- 4) штыковидные
- 5) клювовидные с шипами

65. Для удаления верхних премоляров используют щипцы:

Номер правильного ответа: 3

- 1) прямые
- 2) S-образные с шипом
- 3) S-образные без шипа
- 4) клювовидные
- 5) байонетные

66. Для удаления верхних моляров используют инструменты:

Номер правильного ответа: 2

- 1) прямые щипцы
- 2) S-образные щипцы с шипом
- 3) S-образные щипцы без шипа
- 4) клювовидные щипцы
- 5) элеваторы

67. Для удаления третьих верхних моляров используют инструменты:

Номер правильного ответа: 4

- 1) штыковидный элеватор
- 2) клювовидные щипцы без шипов
- 3) угловые элеваторы
- 4) специальные щипцы
- 5) клювовидные щипцы с шипами

68. Для удаления третьих нижних моляров используют инструменты:

Номер правильного ответа: 2

- 1) штыковидный зонд
- 2) щипцы, изогнутые по плоскости
- 3) S-образные щипцы без шипа
- 4) прямые щипцы
- 5) S-образные щипцы с шипом

69. Заключительным этапом при удалении корней зубов является:

Номер правильного ответа: 4

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Вторая категория.

- 1) ротация
- 2) тракция
- 3) сепарация
- 4) кюретаж
- 5) люксация

70. При удалении зубов с сохраненной коронкой применяются:

Номер правильного ответа: 2

- 1) щипцы со сходящимися щечками
- 2) щипцы с несходящимися щечками
- 3) элеваторы прямые
- 4) элеваторы угловые
- 5) гладилки

71. Для обработки лунки после удаления зуба применяют:

Номер правильного ответа: 2

- 1) элеватор
- 2) кюретажную ложку
- 3) зонд
- 4) серповидную гладилку
- 5) зеркало

72. В области дна верхнечелюстной пазухи близко располагаются корни зубов:

Номер правильного ответа: 3

- 1) резцов и клыков
- 2) клыков и премоляров
- 3) премоляров и моляров
- 4) моляров и резцов
- 5) премоляров и резцов

73. При операции удаления корней центральных резцов верхней челюсти применяется:

Номер правильного ответа: 2

- 1) штыковидный элеватор
- 2) прямые щипцы со сходящимися щечками
- 3) клювовидные щипцы со сходящими щечками
- 4) S-образные щипцы
- 5) клювовидные щипцы с несходящими щечками

74. При удалении шестого зуба нижней челюсти производят первое движение:

Номер правильного ответа: 4

- 1) ротацию
- 2) ротацию и люксацию
- 3) люксацию в язычную сторону
- 4) люксацию в щечную сторону
- 5) тракцию

75. Для удаления корней верхних премоляров предназначены щипцы с щечками:

Номер правильного ответа: 3

- 1) прямые с несходящимися
- 2) S-образные с несходящимися
- 3) S-образные со сходящимися
- 4) клювовидные со сходящимися
- 5) клювовидные с несходящимися

76. Для удаления правых верхних моляров с сохраненной коронкой предназначены щипцы:

Номер правильного ответа: 3

- 1) S-образные с шипом справа
- 2) S-образные с несходящимися щечками без шипа
- 3) S-образные с шипом слева
- 4) штыковидные

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Вторая категория.

5) клювовидные

77. Для удаления корней верхних моляров предназначены щипцы:

Номер правильного ответа: 4

- 1) S-образные с несходящимися щечками
- 2) S-образные с шипами
- 3) прямые со сходящимися щечками
- 4) штыковидные
- 5) прямые с несходящими щечками

78. Для удаления корней нижних зубов предназначены щипцы:

Номер правильного ответа: 2

- 1) клювовидные с шипами
- 2) клювовидные со сходящимися щечками
- 3) изогнутые по плоскости с шипами
- 4) S-образные со сходящимися щечками
- 5) байонетные

79. Прием ротации производят при удалении:

Номер правильного ответа: 4

- 1) моляров нижней челюсти
- 2) премоляров верхней челюсти
- 3) моляров верхней челюсти
- 4) резцов верхней челюсти
- 5) резцов нижней челюсти

80. При удалении второго моляра нижней челюсти производят первое движение:

Номер правильного ответа: 3

- 1) ротацию
- 2) ротацию и люксацию
- 3) люксацию в язычную сторону
- 4) люксацию в щечную сторону
- 5) тракцию

81. Показанием к срочному удалению зуба является:

Номер правильного ответа: 4

- 1) дистопированные зубы
- 2) хронический пульпит
- 3) разрушение коронки зуба
- 4) некупируемое гнойное воспаление в периодонте
- 5) подвижность зуба 3 степени

82. Показанием к плановому удалению зуба является:

Номер правильного ответа: 3

- 1) острый остеомиелит
- 2) острый периостит
- 3) подвижность зуба 3 степени
- 4) хронический пульпит
- 5) острый пульпит

83. Первым движением при удалении шестого зуба верхней челюсти является:

Номер правильного ответа: 3

- 1) ротация
- 2) люксация и ротация
- 3) люксация в небную сторону
- 4) люксация в щечную сторону
- 5) люксация в обе стороны

84. Для удаления моляров на нижней челюсти при затрудненном открывании полости рта применяются:

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Вторая категория.

Номер правильного ответа: 1

- 1) щипцы изогнутые по плоскости
- 2) клювовидные щипцы со сходящимися щечками
- 3) клювовидные щипцы с шипами
- 4) элеватор Леклюза
- 5) байонетные щипцы

85. Основной вид обезболивания, применяемый при операции удаления зуба:

Номер правильного ответа: 1

- 1) местное
- 2) общее (наркоз)
- 3) комбинированное
- 4) нейрорептанальгезия
- 5) акупунктура

86. Общим обезболиванием является:

Номер правильного ответа: 2

- 1) атаралгезия
- 2) эндотрахеальный наркоз
- 3) проводниковая анестезия
- 4) вагосимпатическая блокада
- 5) инфильтрационная анестезия

87. Анатомическим ориентиром при проведении мандибулярной анестезии внутриворотным способом является:

Номер правильного ответа: 4

- 1) моляры
- 2) височный гребешок
- 3) позадиомолярная ямка
- 4) крыловидночелюстная складка
- 5) премоляры

88. Непосредственным общим осложнением местной анестезии является:

Номер правильного ответа: 1

- 1) обморок
- 2) гематома
- 3) контрактура
- 4) кровотечение
- 5) пародонтит

89. Обморок - это:

Номер правильного ответа: 3

- 1) проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания
- 2) аллергическая реакция на антиген
- 3) потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса
- 4) гипертонус мышц
- 5) дыхательная недостаточность

90. При передозировке адреналина больному необходимо ввести:

Номер правильного ответа: 1

- 1) внутривенно 1 мл атропина
- 2) внутривенно 1 мл мезатона
- 3) внутримышечно 1 мл норадреналина
- 4) внутримышечно баралгин
- 5) внутривенно героин

91. Коллапс - это:

Номер правильного ответа: 3

- 1) аллергическая реакция на антиген
- 2) потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Вторая категория.

- 3) проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания
- 4) гипертонус мышц
- 5) дыхательная недостаточность

92. Во время коллапса кожные покровы:

Номер правильного ответа: 2

- 1) сухие, бледные
- 2) влажные, бледные
- 3) сухие, гиперемированные
- 4) влажные, гиперемированные
- 5) нормальные

93. Пульс во время коллапса:

Номер правильного ответа: 1

- 1) частый, нитевидный
- 2) нитевидный, редкий
- 3) частый, хорошего наполнения
- 4) редкий, хорошего наполнения
- 5) нормальный

94. Анафилактический шок преимущественно развивается на фоне:

Номер правильного ответа: 4

- 1) диатеза
- 2) интоксикации
- 3) хронического панкреатита
- 4) перенесенной ранее аллергической реакции
- 5) атеросклероза

95. Количество толчков в одну минуту при проведении непрямого массажа сердца:

Номер правильного ответа: 2

- 1) 30
- 2) 60
- 3) 90
- 4) 75
- 5) 120

96. При проведении непрямого массажа сердца руки реаниматора располагаются на:

Номер правильного ответа: 3

- 1) эпигастрии
- 2) нижней трети грудины
- 3) средней трети грудины
- 4) яремной вырезки
- 5) боковой поверхности груди

97. Показанием к удалению зуба является:

Номер правильного ответа: 4

- 1) острый пульпит
- 2) глубокий кариес
- 3) острый периодонтит
- 4) хронический гранулематозный периодонтит
- 5) пародит

98. Прямыми щипцами удаляют:

Номер правильного ответа: 4

- 1) моляры
- 2) премоляры
- 3) зубы мудрости
- 4) резцы верхней челюсти
- 5) резцы нижней челюсти

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Вторая категория.

99. S-образными щипцами без шипов удаляют:

Номер правильного ответа: 4

- 1) корни зубов
- 2) моляры нижней челюсти
- 3) моляры верхней челюсти
- 4) премоляры верхней челюсти
- 5) 3-й моляры нижней челюсти

100. S-образными щипцами с шипом удаляют:

Номер правильного ответа: 3

- 1) резцы
- 2) 3-й моляры
- 3) моляры верхней челюсти
- 4) премоляры верхней челюсти
- 5) 3-й моляры нижней челюсти

101. Штыковидными щипцами удаляют:

Номер правильного ответа: 5

- 1) резцы нижней челюсти
- 2) моляры верхней челюсти
- 3) премоляры нижней челюсти
- 4) 3-й моляры нижней челюсти
- 5) корни и премоляры верхней челюсти

102. Клювовидными щипцами со сходящимися щечками удаляют:

Номер правильного ответа: 5

- 1) резцы нижней челюсти
- 2) моляры нижней челюсти
- 3) премоляры верхней челюсти
- 4) 3-й моляры верхней челюсти
- 5) корни зубов нижней челюсти

103. Клювовидными щипцами с несходящимися щечками удаляют зубы нижней челюсти:

Номер правильного ответа: 3

- 1) резцы верхней челюсти
- 2) моляры верхней челюсти
- 3) премоляры нижней челюсти
- 4) корни зубов нижней челюсти
- 5) премоляры верхней челюсти

104. На нижней челюсти элеваторами под углом удаляют:

Номер правильного ответа: 4

- 1) клыки
- 2) резцы
- 3) премоляры
- 4) корни зубов
- 5) моляры

105. Штыковидным элеватором (элеватором Леклюза) удаляют зубы нижней челюсти:

Номер правильного ответа: 5

- 1) резец
- 2) премоляр
- 3) первый моляр
- 4) второй моляр
- 5) третий моляр

106. Осложнения, возникающие во время операции удаления зуба:

Номер правильного ответа: 5

- 1) верхнечелюстной синусит
- 2) периостит

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Вторая категория.

- 3) альвеолит
- 4) остеомиелит
- 5) перелом коронки или корня удаляемого зуба

107. Осложнения, возникающие непосредственно после операции удаления зуба:

Номер правильного ответа: 2

- 1) паротит
- 2) кровотечение
- 3) невралгия тройничного нерва
- 4) артрит височно-нижнечелюстного сустава
- 5) анкилоз височно-нижнечелюстного сустава

108. Возможное осложнение во время операции удаления зубов верхней челюсти:

Номер правильного ответа: 3

- 1) паротит
- 2) невралгия тройничного нерва
- 3) перфорация дна верхнечелюстной пазухи
- 4) артрит височно-нижнечелюстного сустава
- 5) анкилоз височно-нижнечелюстного сустава

109. Возможное осложнение во время операции удаления моляров верхней челюсти:

Номер правильного ответа: 2

- 1) паротит
- 2) отлом бугра верхней челюсти
- 3) невралгия тройничного нерва
- 4) анкилоз височно-нижнечелюстного сустава
- 5) артрит височно-нижнечелюстного сустава

110. Возможное осложнение во время операции удаления 3-го моляра нижней челюсти:

Номер правильного ответа: 5

- 1) синусит
- 2) периостит
- 3) альвеолит
- 4) остеомиелит
- 5) перелом нижней челюсти

111. К общесоматическим осложнениям во время операции удаления зуба относят:

Номер правильного ответа: 5

- 1) анурез
- 2) синусит
- 3) альвеолит
- 4) остеомиелит
- 5) гипертонический криз

112. К общесоматическим осложнениям во время операции удаления зуба относят:

Номер правильного ответа: 5

- 1) анурез
- 2) синусит
- 3) альвеолит
- 4) остеомиелит
- 5) анафилактический шок

113. К общесоматическим осложнениям во время операции удаления зуба относят:

Номер правильного ответа: 3

- 1) анурез
- 2) синусит
- 3) обморок
- 4) альвеолит
- 5) остеомиелит

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Вторая категория.

114. К общесоматическим осложнениям во время операции удаления зуба относят:

Номер правильного ответа: 3

- 1) анурез
- 2) синусит
- 3) коллапс
- 4) альвеолит
- 5) остеомиелит

115. К отдаленным местным осложнениям, возникающим после операции удаления зуба, относят:

Номер правильного ответа: 5

- 1) анурез
- 2) миозит
- 3) коллапс
- 4) невралгию
- 5) альвеолит

116. К отдаленным местным осложнениям, возникающим после операции удаления зуба, относят:

Номер правильного ответа: 5

- 1) анурез
- 2) миозит
- 3) коллапс
- 4) невралгию
- 5) остеомиелит

117. К отдаленным местным осложнениям, возникающим после операции удаления зуба, относят:

Номер правильного ответа: 5

- 1) анурез
- 2) миозит
- 3) коллапс
- 4) невралгию
- 5) альвеолоневрит

118. К отдаленным осложнениям местного характера после операции удаления зуба верхней челюсти относят:

Номер правильного ответа: 5

- 1) анурез
- 2) миозит
- 3) коллапс
- 4) невралгия
- 5) оро-антральное сообщение

119. Щипцы для удаления резцов верхней челюсти:

Номер правильного ответа: 2

- 1) прямые корневые
- 2) прямые коронковые
- 3) клювовидные корневые
- 4) изогнутые по плоскости
- 5) S-образные с несходящимися щечками

120. Щипцы для удаления корней резцов верхней челюсти:

Номер правильного ответа: 5

- 1) штыковидные
- 2) клювовидные корневые
- 3) изогнутые по плоскости
- 4) S-образные с несходящимися щечками
- 5) прямые корневые

121. Для удаления клыков верхней челюсти используют щипцы:

Номер правильного ответа: 1

- 1) прямые коронковые

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Вторая категория.

- 2) прямые корневые
- 3) S-образные с шипом
- 4) клювовидные корневые
- 5) изогнутые по плоскости

122. Щипцы для удаления корней клыков верхней челюсти:

Номер правильного ответа: 1

- 1) прямые корневые
- 2) S-образные с шипом
- 3) клювовидные корневые
- 4) изогнутые по плоскости
- 5) S-образные со сходящимися щечками

123. Щипцы для удаления премоляров верхней челюсти:

Номер правильного ответа: 2

- 1) прямые корневые
- 2) S-образные без шипа
- 3) клювовидные корневые
- 4) изогнутые по плоскости
- 5) S-образные со сходящимися щечками

124. Щипцы для удаления корней премоляров верхней челюсти:

Номер правильного ответа: 1

- 1) S-образные сходящиеся
- 2) прямые корневые
- 3) S-образные с шипом
- 4) клювовидные корневые
- 5) изогнутые по плоскости

125. Щипцы для удаления первого и второго правых моляров верхней челюсти называются S-образными:

Номер правильного ответа: 2

- 1) сходящимися
- 2) с шипом слева
- 3) несходящимися
- 4) с шипом справа
- 5) клювовидными сходящимися

126. Щипцы для удаления первого и второго левых моляров верхней челюсти называются S-образными:

Номер правильного ответа: 4

- 1) сходящимися
- 2) с шипом слева
- 3) несходящимися
- 4) с шипом справа
- 5) с круглыми щечками

127. Щипцы для удаления третьих моляров верхней челюсти:

Номер правильного ответа: 5

- 1) прямые
- 2) S-образные с шипом
- 3) S-образные сходящиеся
- 4) штыковидные со сходящимися щечками
- 5) штыковидные с несходящимися закругленными щечками

128. Инструмент для удаления третьих моляров верхней челюсти:

Номер правильного ответа: 2

- 1) прямые щипцы
- 2) прямой элеватор
- 3) S-образные щипцы с шипом

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Вторая категория.

- 4) штыковидные щипцы
- 5) штыковидный элеватор

129. Щипцы для удаления корней резцов верхней челюсти:

Номер правильного ответа: 2

- 1) клювовидные
- 2) штыковидные
- 3) S-образные сходящиеся
- 4) S-образные с шипом справа
- 5) S-образные несходящиеся

130. Для удаления корней резцов верхней челюсти используют:

Номер правильного ответа: 1

- 1) прямой элеватор
- 2) клювовидные щипцы
- 3) клювовидные щипцы с шипиками
- 4) S-образные сходящиеся щипцы
- 5) S-образные несходящиеся щипцы

131. Щипцы для удаления резцов нижней челюсти:

Номер правильного ответа: 2

- 1) клювовидные сходящиеся
- 2) клювовидные несходящиеся
- 3) S-образные щипцы с шипом
- 4) горизонтальные коронковые
- 5) штыковидные щипцы со сходящимися щечками

132. Щипцы для удаления клыков нижней челюсти:

Номер правильного ответа: 3

- 1) клювовидные сходящиеся
- 2) S-образные щипцы с шипом
- 3) клювовидные несходящиеся
- 4) горизонтальные коронковые
- 5) штыковидные щипцы со сходящимися щечками

133. Щипцы для удаления премоляров нижней челюсти:

Номер правильного ответа: 3

- 1) клювовидные сходящиеся
- 2) S-образные щипцы с шипом
- 3) клювовидные несходящиеся
- 4) горизонтальные коронковые
- 5) штыковидные щипцы со сходящимися щечками

134. Щипцы для удаления первого и второго моляров нижней челюсти:

Номер правильного ответа: 4

- 1) клювовидные сходящиеся
- 2) S-образные с шипом
- 3) горизонтальные коронковые
- 4) клювовидные несходящиеся с шипиками
- 5) штыковидные со сходящимися щечками

135. Щипцы для удаления третьего моляра нижней челюсти:

Номер правильного ответа: 3

- 1) клювовидные сходящиеся
- 2) S-образные с шипом
- 3) горизонтальные коронковые
- 4) клювовидные несходящиеся с шипом
- 5) штыковидные со сходящимися щечками

136. Инструмент для удаления третьего моляра нижней челюсти:

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Вторая категория.

Номер правильного ответа: 1

- 1) прямой элеватор
- 2) S-образные щипцы
- 3) клювовидные щипцы
- 4) щипцы клювовидные с шипом
- 5) S-образные сходящиеся щипцы

137. Инструмент для удаления третьего моляра нижней челюсти:

Номер правильного ответа: 2

- 1) прямые щипцы
- 2) угловой элеватор
- 3) клювовидные щипцы с шипом
- 4) S-образные сходящиеся щипцы
- 5) S-образные несходящиеся щипцы

138. Инструмент для удаления третьего моляра нижней челюсти:

Номер правильного ответа: 2

- 1) прямые щипцы
- 2) элеватор Леклюза
- 3) клювовидные щипцы с шипом
- 4) S-образные сходящиеся щипцы
- 5) S-образные несходящиеся щипцы

139. Инструмент для удаления корней зубов нижней челюсти:

Номер правильного ответа: 4

- 1) прямые щипцы
- 2) иглодержатель
- 3) клювовидные щипцы с шипом
- 4) клювовидные сходящиеся щипцы
- 5) S-образные несходящиеся щипцы

140. Инструмент для удаления корней зубов нижней челюсти:

Номер правильного ответа: 3

- 1) гладилка
- 2) прямые щипцы
- 3) угловой элеватор
- 4) клювовидные щипцы с шипом
- 5) S-образные несходящиеся щипцы

141. Дополнительный инструмент для удаления корней зубов нижней и верхней челюстей:

Номер правильного ответа: 1

- 1) бормашина
- 2) прямые щипцы
- 3) иглодержатель
- 4) крючок Лимберга
- 5) элеватор Карапетяна

142. Дополнительный инструмент для удаления корней зубов нижней и верхней челюстей:

Номер правильного ответа: 1

- 1) экскаватор
- 2) прямые щипцы
- 3) иглодержатель
- 4) крючок Лимберга
- 5) элеватор Карапетяна

143. Дополнительный инструмент для удаления корней зубов нижней и верхней челюстей:

Номер правильного ответа: 1

- 1) гладилка
- 2) прямые щипцы
- 3) иглодержатель

Тесты на аттестацию. Стоматология хирургическая. Вторая категория.

- 4) крючок Лимберга
- 5) элеватор Карапетяна

144. Под онкологической настороженностью понимают знание:

Номер правильного ответа: 1

- 1) ранних симптомов заболевания
- 2) препаратов для лечения
- 3) профессиональных вредностей
- 4) допустимых доз лучевой терапии
- 5) расположения онкологических служб

145. Прием Геймлиха применяется при каких ситуациях

Номер правильного ответа: 1

- 1) Обструкция верхних дыхательных путей и отсутствие рефлексорного кашля, либо кашель не эффективен
- 2) Травме позвоночника
- 3) Инспираторной одышке
- 4) Астматическом статусе

146. Сколько по времени необходимо проводить сердечно-легочную реанимацию

Номер правильного ответа: 3

- 1) 10 минут
- 2) 30 минут
- 3) До приезда бригады скорой помощи
- 4) Пока есть силы у людей оказывающих неотложную помощь

147. Кто должен проводить сердечно -легочную реанимацию в стоматологической клинике

Номер правильного ответа: 4

- 1) Администратор
- 2) Заведующий отделением
- 3) Главный врач
- 4) Врач и м/с, на приеме у которых произошло неотложное состояние

148. С какой глубиной следует проводить компрессии грудной клетки при сердечно-легочной реанимации:

Номер правильного ответа: 2

- 1) до 2-3 см.
- 2) до 5-6 см
- 3) до 3-4 см
- 4) до 4-5 см

149. Дайте определения сердечно –легочной реанимации

Номер правильного ответа: 1

- 1) Комплекс мер медицинского характера, направленных на возвращение к жизни пациента, находящегося в состоянии клинической смерти
- 2) Комплекс мер, направленных на обеспечение проходимости верхних дыхательных путей
- 3) Проведение приема Сафара
- 4) Комплекс мер, направленных на обеспечение проходимости нижних дыхательных путей

150. Особенность сердечно легочной реанимации у беременных

Номер правильного ответа: 2

- 1) Нет особенностей
- 2) Валик под правый бок – сдвинуть матку влево (освободить нижнюю полую вену), при проведении компрессий грудной клетки давить выше середины грудины
- 3) Не проводить никаких мероприятий до приезда БСМП
- 4) Прежде чем проводить СЛР, провести ингаляцию кислорода